

Școli Prietenoase cu Natura

1. Hrănirea păsărilor în timpul iernii

În anotimpul cald, păsările găsesc cu ușurință hrană, atât de origine vegetală, cât și animală precum insecte, moluște, amfibieni sau reptile. Restrângerea resurselor de hrană în perioada rece/de iarnă contribuie la dezvoltarea a două strategii în lumea păsărilor: o parte dintre ele migrează, iar altele rămân (ex. pițigoi mare, pițigoi albastru, pițigoi sur, țiclean, vrabia de casă și cea de câmp, mierlă, cintează, botgros, speciile de ciocănitori, gaiță) și se adaptează condițiilor existente prin schimbarea tipului de hrană consumat și accesarea resurselor de hrană disponibile (semințe, fructe).

Odată cu venirea zăpezilor, aceste resurse devin din ce în ce mai greu accesibile, iar din cauza temperaturilor scăzute, menținerea temperaturii corpului necesită mai multă energie. Tocmai de aceea este recomandată amplasarea hrănitivilor în aceste perioade, fiind probabil cea mai răspândită activitate de protecție a păsărilor sălbatice în localități.

Perioada recomandată de hrănire este noiembrie - aprilie, dar trebuie luate în considerare și condițiile meteorologice. Hrănirea trebuie să fie continuă. Se recomandă alimentarea hrănitivilor după masa sau seara, astfel încât păsările flămânde să aibă resurse de hrană dis-de-diminează.

Cum se asigură hrănirea pe perioada vacanței?

- se desemnează un grup de elevi, care alimentează hrănitivile periodic și în cursul vacanței, sau
- se amplasează o bucată mai mare de osânză/slănină crudă înaintea începerii vacanței

Tipuri de hrană recomandate:

- semințe uleioase: semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, semințe de in și de cânepă, miez de nucă, alune
- hrană vegetală: legume fierte sau fructe crude care se găsesc și la noi în grădini precum mere, pere, prune
- grăsime animală: osânză, slănină crudă
- bile pentru pițigoii: se amestecă untura cu semințe uleioase, iar în vederea creșterii consistenței se poate adăuga și mălai grișat.

Atenție: semințele, slăcina trebuie să fie crude! Nu este permisă hrănirea păsărilor cu semințe/slănină sărate, prăjite, condimentate.

Tipuri de hrană contraindicate:

- alimente sărate, condimentate: semințe sărate, prăjite, slănină condimentată, afumată
- alimente procesate
- pâine
- paste și orez
- cereale: grâu, orz, ovăz, tărâță, porumb

Tipuri de hrănituri:

- **Hrănitore pe sol:** este cea mai simplă metodă de hrănire a păsărilor, când alimentele recomandate se împrăștie pe sol într-un loc mai puțin frecventat de oameni și ferit de zăpadă, ca de ex. sub copaci, tufărișuri. Hrănitorea va fi vizitată de un număr mare de specii, indiferent de dimensiunea ei, iar noaptea va oferi resurse de hrană pentru micile mamifere și, implicit pentru speciile de bufnițe care le vor vâna. Cel mai mare dezavantaj al acestui tip de hrănitore este accesul pisicilor.
- **Hrănitore de tip căsuță:** seamănă cu o căsuță, dar pentru a facilita accesul păsărilor la semințe este deschisă în toate cele 4 laturi și este fixată pe un suport înfipt în sol. Necesită un spațiu mai mare, deschis, cu vegetație mai înaltă (tufe sau copaci) în preajmă. Dacă hrănitorea de tip căsuță are doar 2 sau 3 laturi deschise, se agață pe o creangă, se fixează pe trunchiul arborelui sau pe perete.
- **Hrănitore de tip tavă:** poate fi folosită de locatarii apartamentelor. Se amplasează pe pervaz sau balcon în așa fel încât semințele să nu pice pe balconul vecinului de jos.

- **Hrănitore suspendate:** se pot confecționa și din materiale reciclate: ex. sticle de plastic, cutii de lapte sau de conserve sau chiar din dovleac ornamental (*Lagenaria siceraria*), care datorită cojii lignificate are o durabilitate mai mare. Mărimea orificiului prin care păsările au acces la semințe reprezintă factor de selecție a speciilor. Diametrul minim recomandat este de 36 mm, care permite hrănirea speciilor de pițigoi, cintezele, țicleanului etc. Un orificiu mai mare, permite accesul păsărilor mai mari la semințele uleioase amplasate în hrănitore.
- **Bilele de pițigoi** se așază într-o plasă și se suspendă pe copaci la fel ca și slănina crudă. Hrănitorele cu cel puțin un perete format din plasă de sârmă (dimensiune orificiu plasă: cât să nu curgă din hrănitore semințele) previn accesul porumbeilor la resursele de hrană. Hrănitorele amplasate trebuie să fie inaccesibile pisicilor. Astfel, suportul hrănitorelor poate fi împrejmuț cu o tablă. Hrănitorele trebuie așezate într-un spațiu mai deschis, care poate fi supravegheat de către păsări. Totuși se recomandă ca la câțiva metri (3-4) să se afle un pom sau o tufă, în care păsările să se poată refugia la nevoie. Printre musafirii hrănitorelor de tip căsuță se numără și veverițele.